

Колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника. По распространённости колоректальный рак занимает второе место после рака лёгких среди всех локализаций злокачественных опухолей. В целях ранней диагностики колоректального рака назначают колонофиброскопию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОЛОНОФИБРОСКОПИИ ПРЕПАРАТОМ ЭЗИКЛЕН®.

Схема приема препарата в режиме дробного применения в случае, если процедура назначена на утро (например на 10 утра).



Схема ДВУХЭТАПНОГО приема препарата, если колоноскопия назначена на ПЕРВВУЮ половину дня (до 13.00).

	Прием ПЕРВОЙ дозы НАКАНУНЕ процедуры		Прием ВТОРОЙ дозы – В ДЕНЬ процедуры	
Начало процедуры	Раствор препарата выпить медленно в течение 30-60 мин.	Разрешенная жидкость 1 л	Раствор препарата выпить медленно в течение 30-60 мин.	Разрешенная жидкость 1 л
08:00	16:00 - 17:00	17:00 - 18:00	03:00 - 04:00	04:00 - 05:00
09:00			04:00 - 05:00	05:00 - 06:00
10:00	19:00 - 20:00	20:00 - 21:00	05:00 - 06:00	06:00 - 07:00
11:00			06:00 - 07:00	07:00 - 08:00
12:00			07:00 - 08:00	08:00 - 09:00
13:00			08:00 - 09:00	09:00 - 10:00

В таблице указана рекомендуемая схема препарата. Подходящая доза может быть откорректирована врачом

Схема ОДНОЭТАПНОГО приема препарата, если колоноскопия назначена на ВТОРУЮ половину дня (с 14.00 и далее)

	Прием ПЕРВОЙ дозы - В ДЕНЬ процедуры		Прием ВТОРОЙ дозы – В ДЕНЬ процедуры	
Начало процедуры	Раствор препарата выпить медленно в течение 30-60 мин.	Разрешенная жидкость 1 л	Раствор препарата выпить медленно в течение 30-60 мин.	Разрешенная жидкость 1 л
08:00	07:00 - 08:00	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00
09:00	08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00
10:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00
11:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00
12:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00
13:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00

В таблице указана рекомендуемая схема препарата. Подходящая доза может быть откорректирована врачом.

ВАЖНО! В случае проведения процедуры под общей анестезией прием препарата Эзиклен® и других жидкостей следует прекратить не менее. Чем за 3 (три) часа до начала процедуры.

Дополнительные рекомендации по подготовке.

- НЕЛЬЗЯ уменьшать объем воды для приготовления раствора Эзиклен® и дополнительной разрешенной жидкости.
- НЕОБХОДИМО соблюдать последовательность приема раствора Эзиклен® и жидкости: сначала раствор, потом жидкость.
- При специфическом вкусовом восприятии раствора Эзиклен® можно пить его охлажденным, через коктейльную трубочку.
- НЕОБХОДИМО во время приема раствора соблюдать двигательную активность: ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в стороны, вперед-назад, приседания.

Подготовка считается завершенной, когда стул представляет собой полупрозрачную жидкость желтоватого цвета без каловых масс.

